

## VI. BÖLÜM

### TESADÜFİ DEĞİŞKENLER VE FONKSİYONLARI

#### VI.1 Tesadüfi Değişken ve Çeşitleri

##### VI.1.1 Tesadüfi Değişken

$S$  örnek uzayının her bir basit olayını yalnız bir gerçek değere dönüştüren  $X$  fonksiyonuna tesadüfi değişken denir ve bu fonksiyon,  $X: S \rightarrow A \subset R$  ile ifade edilir.

Tesadüfi değişkenler  $X, Y, \dots$  gibi büyük harflerle ve bunların almış oldukları değerler ise  $x, y, \dots$  gibi küçük harflerle gösterilir.

##### VI.1.2 Tesadüfi Değişken Çeşitleri

Örnek uzayından reel sayılara tanımlanan bir fonksiyon olan tesadüfi değişken, aldığı sayısal değerlere göre iki farklı şekilde olabilir.

$X$  tesadüfi değişkeni (t. d.)  $R$ 'deki değer kümesi olan  $A$  sayılabilir veya sayılabilir olarak sonsuz bir küme ise  $X$ 'e kesikli t. d. denir.  $X$  t. d.'nin  $R$ 'deki değer kümesi  $A$ , sayılamaz bir küme ise  $X$ 'e sürekli t. d. denir.

#### VI.2 Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları

Örnek uzayında tanımlanan her olay,  $X$  t. d. cinsinden yazılabildiğine göre ilgilenilen tüm olasılıklar  $X$ 'e bağlı bir fonksiyonun kullanılması ile kolay bir şekilde hesaplanabilir.

$X$  kesikli bir t. d. ve bunun değer kümesi,  $A = \{x_i: i = 1, 2, \dots\}$  olsun.

$$p(x) = P(X = x_i) = \begin{cases} p(x_i), & \forall x_i \in A \text{ için} \\ 0, & \text{diğer durumlarda (yani; } x_i \notin A) \end{cases}$$

Şeklinde tanımlanan fonksiyona olasılık fonksiyonu denir.

♦ **Örnek:** İki hilesiz madeni paranın birlikte (veya bir hilesiz madeni paranın iki kez) atılması deneyinde  $X$ , üste gelen tura sayısını gösterebilir. Bu tesadüfi deneye ilişkin olasılık fonksiyonunu yazınız.

♦ **Çözüm:** Deneye ilişkin örnek uzayı,  $S = \{YY, YT, TY, TT\}$  yazılır.  $X(YY) = 0$ ,  $X(YT) = X(TY) = 1$  ve  $X(TT) = 2$  olup  $X$ 'in değer kümesi,  $A = \{0, 1, 2\}$  yazılabilir. Böylece  $X$ 'in olasılık fonksiyonu (o.f.),

$X = x_i$	0	1	2	Toplam
$P(X = x_i) = p(x_i)$	1/4	1/2	1/4	1.00

yazılır.

♦  $X$ , değer kümesi  $A$  olan sürekli bir t. d. iken  $\forall A_i = (a, b) \subset A$  için  $P\{X \in A_i\} = \int_a^b f(x)dx$  özelliğini sağlayan  $f(x)$  fonksiyonuna  $X$ 'in olasılık yoğunluk fonksiyonu denir.

### VI.2.1 Olasılık/ Yoğunluk Fonksiyonunun Özellikleri

Özellik No	$X$ kesikli t. d. ise	$X$ sürekli t. d. ise
1	$p(x_i) \geq 0, \forall x_i$ için (pozitif tanımlılık özelliği)	$f(x) \geq 0, \forall A_i = (a, b)$ için
2	$\sum_{x_i \in A} p(x_i) = 1$	$\int_a^b f(x)dx = 1$

♦ **Örnek:**  $X$  t. d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu (o.y.f),

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

verisin.a)  $f(x)$ 'in o.y.f. olduğunu gösteriniz, b)  $X$ 'in  $1/2$ 'den küçük olması olasılığını gösteriniz.

♦ **Çözüm:** a) i) Alt limit: o iken  $f(0) = 2(0) = 0 \geq 0$  ve üst limit:1 iken  $f(1) = 2(1) = 2 \geq 0$  olup tanım bölgesinde pozitif tanımlı olduğu açıktır. ii) Tanım bölgesinde alan bire eşit olalıdır. Yani;  $\int_0^1 f(x)dx = 1$  olmalı. Öyle ise  $\int_0^1 2xdx = x^2|_0^1 = 1$  bulunur. Böylece  $f(x)$  o.y.f.'dur. b)  $P(X < 1/2) = \int_0^{1/2} 2xdx = x^2|_0^{1/2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1/4 = \%25$  bulunur.

♦ **Örnek:**  $X$  t. d.'nin o. f.,

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{15}, & x = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

verilsin.  $A = \{x: x \geq 2\}$ ,  $B = \{x: 1 < x\}$  ve  $C = \{x: \frac{3}{2} < x \leq 3\}$  olayları tanımlanmış ise a)  $P(A \cap B)$ , b)  $P(\bar{C})$ , c)  $P(B \cup C)$ , d)  $P(B / C)$  ve e)  $P\{(A \cup C) / B\}$  olasılıklarını hesaplayınız.

♦ **Çözüm:** a)  $A \cap B = \{2, 3, 4, 5\}$  olup  $P(A \cap B) = \frac{2}{15} + \frac{3}{15} + \frac{4}{15} + \frac{5}{15} = \frac{14}{15}$ , b)  $C = \{2, 3\}$  olup  $\bar{C} = \{1, 4, 5\} \Rightarrow P(\bar{C}) = \frac{1}{15}(1 + 4 + 5) = \frac{2}{3}$ , c)  $B \cup C = \{2, 3, 4, 5\} \Rightarrow P(B \cup C) = \frac{1}{15}(2 + 3 + 4 + 5) = \frac{14}{15}$ , d)  $P(B / C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{15}(2+3)}{\frac{1}{15}(2+3)} = 1$  e)  $A \cup C = \{2, 3, 4, 5\} \Rightarrow (A \cup C) \cap B = \{2, 3, 4, 5\} \Rightarrow P\{(A \cup C) / B\} = \frac{\frac{1}{15}(2+3+4+5)}{\frac{1}{15}(2+3+4+5)} = 1$  bulunur.

♦ **Örnek:**  $X$  t. d.'nin o. y. f.,

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

verilsin.  $A = \{x: \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{4}\}$ ,  $B = \{x: x > \frac{2}{5}\}$  ve  $C = \{x: x \leq \frac{1}{2}\}$  olayları tanımlanmış ise a)  $P(A \cup B)$ , b)  $P(B \cap C)$ , c)  $P\{(\bar{B} \cap A) / C\}$  ve d)  $P\{B / (A \cup C)\}$  olasılıklarını hesaplayınız.

♦ **Çözüm:** a)  $A \cup B = \left\{x: \frac{2}{5} < x < 1\right\} \Rightarrow P(A \cup B) = \int_{2/5}^1 3x^2 dx = x^3 \Big|_{2/5}^1 = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^3 = 1 - \frac{8}{125} = \frac{117}{125}$ , b)  $B \cap C = \left\{x: \frac{2}{5} < x \leq \frac{1}{2}\right\} \Rightarrow P(B \cap C) = \int_{2/5}^{1/2} 3x^2 dx = x^3 \Big|_{2/5}^{1/2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{1}{8} - \frac{8}{125} = \frac{61}{1000}$ , c)  $\bar{B} = \left\{x: 0 < x \leq \frac{2}{5}\right\} \Rightarrow \bar{B} \cap A = \emptyset \Rightarrow (\bar{B} \cap A) \cap C = \emptyset =$   
 $> P\{(\bar{B} \cap A) / C\} = \frac{P(\emptyset)}{P(C)} = \frac{0}{P(C)} = 0$  ve d)  $A \cup C = \left\{x: 0 < x < \frac{3}{4}\right\} \Rightarrow P(A \cup C) = \int_0^{3/4} 3x^2 dx = x^3 \Big|_0^{3/4} = \frac{27}{64}$ ,  $(A \cup C) \cap B = \left\{x: \frac{2}{5} < x < \frac{3}{4}\right\} \Rightarrow P\{(A \cup C) \cap B\} = \int_{2/5}^{3/4} 3x^2 dx = x^3 \Big|_{2/5}^{3/4} = \frac{27}{64} - \frac{8}{125} = \frac{2863}{8000}$  olup  $P\{B / (A \cup C)\} = \frac{P\{B \cap (A \cup C)\}}{P(A \cup C)} = \frac{2863/8000}{27/64} = \frac{2863}{3375}$  bulunur.

### VI.3 Bir Tesadüfi Değişkenin Ortalama ve Varyansı

#### VI.3.1 Bir Tesadüfi Değişkenin Ortalama

Bir  $X$  t. d.'nin ortalaması (veya beklenen değeri),  $\mu_X = E(X)$  ile gösterilir ve

$$\mu_X = E(X) = \begin{cases} \text{Eğer } X \text{ kesikli ise } \sum_{x \in A} xp(x) \\ \text{Eğer } X \text{ sürekli ise } \int xf(x)dx \end{cases}$$

şeklinde tanımlanır.

♦ **Örnek:** Hilesiz bir madeni paranın iki kez (veya iki hilesiz madeni paranın bir kez) atılması tesadüfi deneyinde  $X$  üste gelen yazı sayısı iken  $X$ 'in ortalamasını (beklenen değerini) hesaplayınız.

♦ **Çözüm:**  $X$ 'in o.f.,

$X = x_i$	0	1	2	Toplam
$P(X = x_i) = p(x_i)$	1/4	1/2	1/4	1.00

olduğuna göre  $X$ 'in ortalaması,  $\mu_X = E(X) = \sum_{x=0}^2 xp(x) = 0 \left(\frac{1}{4}\right) + 1 \left(\frac{1}{2}\right) + 2 \left(\frac{1}{4}\right) = 1$  bulunur. Bu sonucun anlamı ise deney bir defa yapıldığında üste bir yazı gelmesinin beklendiği anlamındadır.

♦ **Örnek:**  $X$  t.d.'nin o.y.f.,

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

verilsin.  $X$ 'in ortalamasını (beklenen değerini) hesaplayınız.

♦ **Çözüm:**  $\mu_X = E(X) = \int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 x(3x^2)dx = \frac{3}{4}x^4 \Big|_0^1 = \frac{3}{4}$  bulunur.

### VI.3.2 Bir Tesadüfi Değişkenin Varyans ve Standart Sapması

Bir  $X$  t. d.'nin varyansı,  $\sigma_X^2 = V(X)$  ile gösterilir ve  $\sigma_X^2 = V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$  eşitliği ile hesaplanır.  $X$ 'in standart sapması ise  $\sigma_X$  ile gösterilir ve varyansın pozitif kareköküdür. Yani;  $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$ 'dir.

♦ **Örnek:**  $X$  t.d.'nin o.f.,

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{6}, & x = 1, 2, 3 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

ile verilsin.  $X$ 'in; a) ortalamasını, b) varyansını ve standart sapmasını hesaplayınız.

♦ **Çözüm:** a)  $\mu_X = E(X) = \sum_{x=1}^3 xp(x) = 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{2}{6}\right) + 3\left(\frac{3}{6}\right) = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$ , b)  $\sigma_X^2 = V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \Rightarrow E(X^2) = \sum_{x=1}^3 x^2p(x) = 1^2\left(\frac{1}{6}\right) + 2^2\left(\frac{2}{6}\right) + 3^2\left(\frac{3}{6}\right) = \frac{36}{6} = 6$  ve böylece varyans,  $V(X) = 6 - \left[\frac{7}{3}\right]^2 = \frac{5}{9}$  bulunur. Standart sapması ise  $\sigma_X = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$  bulunur.

♦ **Örnek:**  $X$  t.d.'nin o.y.f.,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9}{2}x, & 0 < x < 2/3 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

verilsin.  $X$ 'in; a) ortalamasını, b) varyansını ve standart sapmasını hesaplayınız.

♦ **Çözüm:** a)  $\mu_X = E(X) = \int_0^{2/3} xf(x)dx = \frac{9}{2} \int_0^1 x(x) dx = \frac{3}{2} x^3 \Big|_0^{2/3} = \frac{3}{2} \left(\frac{8}{27}\right) = \frac{4}{9}$  bulunur. b)  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \Rightarrow E(X^2) = \int_0^{2/3} x^2f(x)dx = \frac{9}{2} \int_0^1 x^2(x) dx = \frac{9}{8} x^4 \Big|_0^{2/3} = \frac{9}{8} \left(\frac{16}{81}\right) = \frac{2}{9}$  ve böylece varyans,  $V(X) = \frac{2}{9} - \left[\frac{4}{9}\right]^2 = \frac{2}{81}$  bulunur. Standart sapması ise  $\sigma_X = \sqrt{V(X)} = \sqrt{2/81} = \frac{\sqrt{2}}{9}$  bulunur.

♦ **Ödev-1:**  $X$  t.d.'nin o.f.,

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{9}, & x = 1, 3, 5 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

ile verilsin.  $X$ 'in; a) ortalamasını (C:  $\mu_X = \frac{35}{9}$ ), b) varyansını (C:  $V(X) = \frac{152}{81}$ ) ve standart sapmasını (C:  $\sigma_X = \frac{\sqrt{152}}{9}$ ) hesaplayınız.

♦ **Ödev-2:**  $X$  t.d.'nin o.y.f.,

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

verilsin.  $X$ 'in; a) ortalamasını (C:  $\mu_X = \frac{1}{2}$ ), b) varyansını (C:  $V(X) = \frac{1}{20}$ ) ve standart sapmasını (C:  $\sigma_X = \frac{1}{\sqrt{20}}$ ) hesaplayınız.

#### VI.4 Altıncı Bölüm Çalışma Soruları

♦ **Uygulama-1:**  $X$  t.d.'nin o.f.,

$x_i$	0	1	2	3	4	5
$p(x_i)$	1/10	3/10	4/10	1/10	a	1/20

verilsin. a)  $p(x)$ 'in o. f. olabilmesi için  $p(4) = a$  olasılığını bulunuz, b)  $P(X \leq 3)$ , c)  $P(X > 2)$ , d)  $P(2 \leq X < 5)$  ve e)  $P(X > 2 / X \leq 3)$  olasılıklarını hesaplayınız.

♦ **Çözüm-1:** a)  $p(x)$ 'in o. f. olabilmesi için  $\sum_{x=0}^5 p(x) = 1$  olmalıdır.  $\Rightarrow p(4) = a = 1 - [p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(5)] = 1 - \left(\frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right) = \frac{1}{20}$  bulunur. b)  $P(X \leq 3) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$ , c)  $P(X > 2) = P(X \geq 3) = p(3) + p(4) + p(5) = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5}$ , d)  $P(2 \leq X < 5) = p(2) + p(3) + p(4) = \frac{4}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{11}{20}$  ve  $P(X > 2 / X \leq 3) = \frac{P[(X > 2) \cap (X \leq 3)]}{P(X \leq 3)} = \frac{p(3)}{1 - [p(4) + p(5)]} = \frac{1/10}{9/10} = \frac{1}{9}$  bulunur.

♦ **Uygulama-2:**  $X$  t.d.'nin o.y.f.,

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

verilsin. a)  $p(x)$ 'in o. f. olabilmesi için  $k$  sabiti ne olmalıdır, b)  $P(X < \frac{1}{2})$ , c)  $P(X \geq \frac{3}{4})$ , d)  $P(1 < X < \frac{3}{2})$  ve e)  $P(X < \frac{3}{2} / X > 1)$  olasılıklarını hesaplayınız.

♦ **Çözüm-2:** a)  $\int_0^2 f(x)dx = 1$  olmalı.  $\Rightarrow k \int_0^2 xdx = \frac{k}{2}x^2 \Big|_0^2 = 1 \Rightarrow 2k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$  bulunur. b)  $P(X < \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \int_0^{1/2} xdx = \frac{1}{4}x^2 \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}$ , c)  $P(X \geq \frac{3}{4}) = \frac{1}{2} \int_{3/4}^2 xdx = \frac{1}{4}x^2 \Big|_{3/4}^2 = 1 - \frac{9}{64} = \frac{55}{64}$ , d)  $P(1 < X < \frac{3}{2}) = \frac{1}{2} \int_1^{3/2} xdx = \frac{1}{4}x^2 \Big|_1^{3/2} = \frac{9}{16} - \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$  ve e)  $P(X < \frac{3}{2} / X > 1) = \frac{P[(X < \frac{3}{2}) \cap (X > 1)]}{P(X > 1)} = \frac{P(1 < X < \frac{3}{2})}{P(X > 1)} = \frac{5/16}{3/4} = \frac{5}{12}$  bulunur.

♦ **Uygulama-3:**  $X$  t.d.'nin o.f.,

$x_i$	0	1	2	3	4	5
$p(x_i)$	0.05	0.10	0.20	0.40	0.20	0.05

verilsin.  $\mu_X$ ,  $\sigma_X^2$  ve  $\sigma_X$  değerlerini hesaplayınız.

♦ **Çözüm-3:**  $\mu_X = E(X) = \sum_{x=0}^5 xp(x) = 2.75$ ,  $E(X^2) = \sum_{x=0}^5 x^2p(x) = 8.95$  olup  $\sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = 8.95 - (2.75)^2 = 1.3875$  bulunur. Buradan  $\sigma_X = \sqrt{1.3875} \cong 1.178$  bulunur.

♦ **Uygulama-4:**  $X$  t.d.'nin o.y.f.,

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{16}(x-1), & 3 < x < 7 \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

ile verilsin.  $\mu_X$ ,  $\sigma_X^2$  ve  $\sigma_X$  değerlerini hesaplayınız.

♦ **Çözüm-4:**  $\mu_X = E(X) = \frac{1}{16} \int_3^7 x(x-1)dx = \frac{1}{16} \left( \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_3^7 = \frac{1}{16} \left( \frac{539}{6} - \frac{27}{6} \right) = \frac{512}{96} = \frac{16}{3}$ ,  $E(X^2) = \frac{1}{16} \int_3^7 x^2(x-1)dx = \frac{89}{3}$  olup  $\sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{89}{3} - \left( \frac{16}{3} \right)^2 = \frac{11}{9}$  ve  $\sigma_X = \frac{\sqrt{11}}{3}$  bulunur.